

Que faire en cas de piqûre de vive ?




Symptômes :

DOULEUR IMMÉDIATE ET INTENSE



Elle débute au point de piqûre puis s'étend à tout le membre (le plus souvent jambe chez les baigneurs, bras chez les pêcheurs).

SUEURS, NAUSÉES, VOMISSEMENTS, ANGOISSE, MALAISE...



ŒDÈME LOCAL

+ Pâleur de la peau au point de piqûre



Il peut y avoir perte de connaissance.
Si l'incident survient dans l'eau, il y a risque de noyade.

Que faire ?

SORTIR DE L'EAU

ou se faire aider pour sortir de l'eau



ÉVITEZ TOUT APPUI

Mettre le membre piqué en décharge (c'est à dire sans appui) : si la piqûre a lieu au niveau de la jambe, s'allonger ou s'asseoir



EN CAS DE MALAISE PRÉVENIR LES SECOURS

ou faire prévenir les secours : au poste de surveillance de la baignade ou appeler le 15 ou 18



IMMÉDIATEMENT APRÈS LA PIQÛRE :

- o **Si vous êtes accueilli en poste de secours** : les secouristes sont équipés et formés à gérer cette situation
- o **Si vous n'êtes pas accueilli dans un poste de secours** : approcher une source de chaleur près du point de piqûre pendant 2 minutes sans se brûler, puis immédiatement après, glacer le point de piqûre (avec de la glace ou un objet froid) pendant 2 minutes (renouveler l'opération si nécessaire). Le venin est détruit par le choc thermique.
- o **Dès que la douleur a cédé**, désinfecter le point de piqûre plusieurs fois par jour pendant 2 à 3 jours et vérifier la vaccination antitétanique.

SURVEILLANCE DU LA VICTIME PENDANT UNE DEMI-JOURNÉE ET SI BESOIN, CONSULTATION MÉDICALE.

Retrouvez l'ARS Pays de la Loire sur www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

et sur les réseaux sociaux

