

COVID-19	Cas testés positifs (1) depuis les 7 derniers jours	Taux d'incidence des cas testés positifs sur 7 jours glissants pour 100 000 hab (1)	Taux de positivité sur les 7 derniers jours pour 100 tests (1)	Hospitalisations (2)	Dont réanimations/ services de soins critiques (2)	Décès	
		Tous âges	Tous âges			Hôpitaux (3)	Etablissements Médico-sociaux (4)
Loire-Atlantique	8 519	592,8	25,2	177	21	1 149	436
Maine-et-Loire	5 070	621,4	27,3	205	22	970	394
Mayenne	2 121	694,6	31,1	31	3	345	157
Sarthe	3 484	621,9	27,0	141	4	758	203
Vendée	4 562	667,8	30,1	52	5	442	199
Pays de la Loire	23 756	624,9	27,2	606	55	3 664	1 389
France ⁽⁵⁾	440 419	656,00	22,80	20 997	1 839	112 014	28 242


(1) Données SI-DEP consolidées au 11/03/2022 - (2) Données SIVIC au 15/03/2022 - (3) Données cumulées SIVIC depuis le 24/02/2020 - (4) Données cumulées Santé Publique France depuis le 20/07/2020 - (5) Données nationales Santé Publique France et CNAM au 14/03/2022

Couverture vaccinale 2 doses

81,9 % en Pays de la Loire

79,2 % en France

Changement le 9/01/2022 : suite à l'ouverture de la vaccination aux enfants de plus de 5 ans, cet indicateur porte désormais sur la population totale (versus 12 ans et plus auparavant, ce qui explique la baisse de ce pourcentage). Cet indicateur reflète la part de la population vaccinée avec un schéma complet (hors rappel) sur la population totale.



Données couverture vaccinale régionale AMELI au 6 mars.

INDICATEURS DE SUIVI sur les 7 derniers jours

23 756 cas confirmés par un test positif : **+ 21 %**

Taux incidence régional : **+ 21 %**

55 patients en réanimation/soins critiques : **- 11 %**

1 % des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 pour la semaine 10⁽¹⁾ : **stable**

448 nouveaux cas confirmés à la COVID en établissements médico-sociaux⁽²⁾ : **+ 17,5 %**

(1) Source : Oscour/Sursaud pour la semaine 10

(2) Source : Santé Publique France – données non consolidées pour la semaine 10

Nos 7 axes stratégiques :

- Anticiper, veiller et disposer du « bon thermomètre » (indicateurs épidémiologiques et d'offre de soins en cinétique) suivi et analysé pour agir « vite et de façon coordonnée » avec nos partenaires ;
- Tester/alerter et protéger, pour casser les chaînes de transmission interpersonnelle (à titre préventif et/ou en réaction, si territoire, cluster ou lieu à risque) ;
- Prévenir (respecter et faire respecter les gestes barrières) : porter un masque quand il est obligatoire et dans des situations à risque, aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures, se laver les mains régulièrement, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, tousser ou éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique et prendre soin, notamment des personnes les plus vulnérables..., âgées, et/ou vivant avec un handicap et/ou précaires, et/ou avec comorbidités ;
- Préconiser aux autorités préfectorales des mesures d'ordre public, chaque fois que de besoin et contribuer à leur réussite ;
- Gérer les situations d'urgence et être solidaires ;
- Communiquer, sensibiliser et engager des actions du « aller vers » ;
- Accompagner la vaccination contre la Covid, en particulier en direction des personnes les plus vulnérables.



Porter un masque quand il est obligatoire ou recommandé



Aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures



Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique



Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter



#Tous AntiCovid