

COVID-19	Cas testés positifs (1) <i>depuis les 7 derniers jours</i>	Taux d'incidence sur 7 jours alissants pour (1)	Taux de positivité sur les 7 derniers jours (1)	Hospitalisations (2)	Dont réanimations/ services de soins critiques (2)	Décès	
		Tous âges	Tous âges			Hôpitaux (3)	Etablissements Médico-sociaux (4)
Loire-Atlantique	4 748	330,0	24,2	70	9	1 250	473
Maine-et-Loire	2 167	265,0	22,3	147	10	1 068	402
Mayenne	763	249,0	21,9	20	1	373	166
Sarthe	1 514	270,0	19,9	41	0	822	212
Vendée	1 650	241,0	21,4	31	3	489	213
Pays de la Loire	10 842	285,0	22,5	309	23	4 002	1 466
France ⁽⁵⁾	174 706	260,0	15,2	16 860	1 088	119 088	28 844


(1) Données SI-DEP consolidées au 20/05/2022 - (2) Données SIVIC au 24/05/2022 - (3) Données cumulées SIVIC depuis le 24/02/2020 - (4) Données cumulées Santé Publique France depuis le 20/07/2020 - (5) Données nationales Santé Publique France et CNAM au 23/05/2022

Couverture vaccinale 2 doses

82,2 % en Pays de la Loire

79,4 % en France

Changement le 9/01/2022 : suite à l'ouverture de la vaccination aux enfants de plus de 5 ans, cet indicateur porte désormais sur la population totale (versus 12 ans et plus auparavant, ce qui explique la baisse de ce pourcentage). Cet indicateur reflète la part de la population vaccinée avec un schéma complet (hors rappel) sur la population totale.



Données couverture vaccinale régionale AMELI au 8 mai 2022

INDICATEURS DE SUIVI sur les 7 derniers jours

- 10 842 cas confirmés par un test positif : - 25 %
- Taux incidence régional : - 25 %
- 23 patients en réanimation/soins critiques⁽¹⁾ : - 23 %
- 0,4 % des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 pour la semaine 19⁽²⁾ : - 0,2 point
- 9 nouveaux cas confirmés à la COVID en établissements médico-sociaux⁽³⁾ : - 91 %

(1) Données SIVIC au 24/05/2022 - (2) Source : Ocsour/Sursaud
(3) Source : Santé Publique France – données non consolidées pour la semaine 20

Nos 7 axes stratégiques :

- Anticiper, veiller et disposer du « bon thermomètre » (indicateurs épidémiologiques et d'offre de soins en cinétique) suivi et analysé pour agir « vite et de façon coordonnée » avec nos partenaires ;
- Tester/alerter et protéger, pour casser les chaînes de transmission interpersonnelle (à titre préventif et/ou en réaction, si territoire, cluster ou lieu à risque) ;
- Prévenir (respecter et faire respecter les gestes barrières) : porter un masque quand il est obligatoire et dans des situations à risque, aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures, se laver les mains régulièrement, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades, tousser ou éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique et prendre soin, notamment des personnes les plus vulnérables..., âgées, et/ou vivant avec un handicap et/ou précaires, et/ou avec comorbidités ;
- Préconiser aux autorités préfectorales des mesures d'ordre public, chaque fois que de besoin et contribuer à leur réussite ;
- Gérer les situations d'urgence et être solidaires ;
- Communiquer, sensibiliser et engager des actions du « aller vers » ;
- Accompagner la vaccination contre la Covid, en particulier en direction des personnes les plus vulnérables.



Porter un masque quand il est obligatoire ou recommandé



Aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures



Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique



Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter



#Tous AntiCovid