

VOUS AVEZ DIT PRÉCAUTIONS "STANDARD" ...


Elles s'appliquent :

- pour tous les soignants
- pour tout patient infecté ou non
- quels que soient sa pathologie, son âge ou son statut sérologique
- en cas de contact avec :
DU SANG, UN AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE, UNE MUQUEUSE, UNE PEAU LÉSÉE ...

VISITEURS



Lorsque je rends visite à mon mari, je fais une friction hydro-alcoolique et je mets un masque si je tousse.



monsieur, avec ou sans staphylocoque ?

?...euh?...
"STANDARD" sans staphylocoque merci !

HYGIÈNE DES MAINS

Je réalise une friction hydroalcoolique pour tout geste.

Entre 2 patients :	Entre 2 activités chez un même patient :
Avant et après	
<ul style="list-style-type: none"> un contact un soin propre un acte invasif le port des gants 	<ul style="list-style-type: none"> entre un soin propre et un soin contaminant après le port des gants

Si mes mains sont souillées : Je me lave les mains avec un savon doux avant la friction.
Il n'est plus recommandé d'utiliser du savon antiseptique pour le lavage des mains des soignants.

PORT DE GANTS

1 paire = 1 geste

Je mets des gants :

- Chaque fois qu'il y a un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée, du linge sale, du matériel souillé, des déchets.
- Lors des soins lorsque mes mains comportent des lésions.

- Je change de gants entre chaque patient.
- Je retire les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement.
- Je retire les gants lorsque, dans une séquence de soins chez un même patient, je passe d'un site contaminé à un autre site contaminé.

Je ne porte pas de gants lors des contacts avec la peau saine.

PROTECTION DE LA TENUE, DES YEUX ET DES MUQUEUSES

Je porte une tenue professionnelle à manches courtes ou une tenue civile avec les avant-bras dégagés (ambulateur).

Je protège ma tenue (surblouse ou tablier plastique) pour tout soin souillant ou mouillant.

Je mets lunettes et masque lorsqu'il y a un risque majeur de projection ou d'aérosolisation de sang et liquide biologique.

Tout patient présentant une toux supposée d'origine infectieuse met un masque s'il circule hors de sa chambre.

TRANSPORT

- Prélèvements biologiques
- Matériel souillé
- Linge souillé

Ils doivent être transportés dans un emballage étanche et fermé.

MATÉRIEL et SURFACE SOUILLÉS

Je vérifie que le matériel a subi un procédé d'entretien (stérilisation ou désinfection) avant d'être utilisé.

Je manipule avec précautions le matériel souillé par du sang ou tout autre liquide biologique et j'immerge dans un bac de détergent désinfectant le matériel souillé dès la fin du soin.

Je nettoie et désinfecte le plus rapidement possible les surfaces souillées par des liquides biologiques.

EN CAS D'ACCIDENTS D'EXPOSITION AU SANG OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES

Immédiatement :

- si piqûre ou blessure : je réalise un lavage et une antiseptie de la plaie.
- si projection sur les muqueuses : je rince abondamment pendant 5 minutes.

Aussitôt après : je contacte un médecin référent.

Dans les 48 h : je fais une déclaration d'accident.

DÉCHETS

J'élimine tous déchets d'activité de soins ou évocateurs de soins dans un sac jaune (DASRI). J'élimine immédiatement tout matériel piquant, tranchant, dans un collecteur adapté et je respecte le niveau de remplissage de ce collecteur.

Les autres déchets sont jetés dans un sac noir (ordure ménagère DAOM) ou vert (tri sélectif).