

Aide au choix du vaccin en fonction du contexte du patient

1^{ère} injection



Patient se présentant pour une 1^{ère} injection de vaccin anti-Covid 19

Atcd d'infection par la COVID? (test PCR+, les tests antigéniques ne sont plus acceptés)


Possibilité, en absence de résultat PCR, de réaliser TROD chez personne immunocompétente pour détecter atcd de covid asympto ou paucisymptomatique

Version 2 juillet 2021

Ref DGS-URGENT N°2021-52

DGS urgent n°2021-61

Consignes aux SPRDV aux centres de vaccination 17/06/21



¹ Personnes : ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ; sous chimiothérapie lymphopéniante ; traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétile, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ; LLC et aux personnes atteintes de certains types de lymphomes traités par anti-CD20 ; dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés ; au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif² Pendant la période estivale, possibilité de délai entre 2 doses 21 à 49 j (Pfizer ou Moderna)/³ avec consentement libre et éclairé du mineur + autorisation (écrite) 2 parents sauf si atteint de pathologie à très haut risque : autorisation écrite 1 parent